



AGROMOSTA
Le Choix de Cultiver



Conditionnement

Bidon de 5 L

Composition

Correcteur de zinc et manganèse
%5,8 N p/v Azote total
%2,9 p/v Azote (N)ammoniacale
%2,9N p/v Azote (N)nitrique
%13,5 Mn p/v Manganèse
%13,5 Zn p/v Zinc
%37,0 SO₃ p/v Soufre

Avantages

Le zinc et le manganèse sont des microéléments essentiels dans la nutrition des agrumes .
Le zinc est impliqué dans la synthèse de nombreuses enzymes responsables de fonctions cellulaires importantes comme la photosynthèse.
Le manganèse intervient aussi dans de nombreux processus métabolique, il entre en coopération avec le fer dans la synthèse de la chlorophylle par exemple d'où l'absence de ces microéléments peut avoir des conséquences négatives sur le niveau de développement et de production des agrumes .

Mode et période d'application:

- Application foliaire : 150cc/hl (%0.15)
- Agrumes : appliquer au moment de la poussée végétative
- Arbres Fruitiers : appliquer au moment du développement végétatif

Basfoliar® CITROPLUS

Grâce aux caractéristiques physiques du **Basfoliar® Citroplus** : émulsion liquide, on peut optimiser l'absorption des nutriments (zinc et manganèse) et assurer une permanence supérieure du produit sur les feuilles , de sorte qu'on allonge la période d'efficacité de l'application.



SARL AGROMOSTA

cité si khaled Mesra Mostaganem

fix / fax : +213 45 48 29 40/50

Mail : contact@agromosta.com / www.agromosta.com





AGROMOSTA
Le Choix de Cultiver

باسفوليار سيتروبلوس



التعبئة

5 لتر

بفضل خصائصه الفيزيائية لباسفوليار سيتروبلوس مستحلب سائل يمكننا من تحسين إمتصاص المواد الغذائية الزنك -منغنيز، ويضمن إستمرارية للمنتج على الأوراق

التركيبية

5,8% و/ح أزوت كلي
2,9% أزوت الأمونيكال
2,9% أزوت النتريك
13,5% منغنيز
13,5% الزنك
37,0% كبريت

المميزات

الزنك والمنغنيز هي عناصر الدقيقة الأساسية في تغذية الحمضيات يشارك الزنك في تركيب العديد من إنزيمات الوظائف الخلوية المهمة مثل تركيب الضوئي، المنغنيز يدخل أيضا في العديد من عمليات الأيضية ينحل في التعاون مع الحديد في تركيب اليخضور على سبيل المثال حيث يمكن أن يكون اغياب هذه العناصر الدقيقة عواقب سلبية على مستوى تطور وإنتاج الحمضيات .



طريقة ووقت التطبيق

عن طريق الرش : 150 مل / 100 ل ماء
الحمضيات : تطبق في وقت نمو البراعم
الأشجار المثمرة : تطبق في وقت تطور النبات

أقروموستا

حي سي خالد 27255 ماسرة - مستغانم - الجزائر
الفاكس / الهاتف : +213 45 48 29 40 / 50

Mail : contact@agromosta.com / www.agromosta.com

