

ASTERIX 24%SC

Un acaricide et un anti-homoptère

Propriétés

ASTERIX 24%SC : Est actif par contact sur tous les stades de développement des acariens.

C'est un acaricide à base de spiromesifène qui appartient à la nouvelle famille chimique des acides tétroniques. Il agit sur acariens (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus spp*) aux différents stades de développement des œufs, larves, nymphes et adultes femelles et sur phytophages (*Aculusschlech tendali*, *Epitrimerus pyri*). Les symptômes sur les acariens sont : la déshydratation, l'inhibition de la mue et l'accumulation des œufs chez les femelles. Son action est progressive et sa persistance d'action est en moyenne de 7 semaines.

Conditionnement

1.02 L

Composition :

ASTERIX 24%SC : Est composé de 240 g/L de spiromesifène

Mode d'utilisation :

Culture cible	RavageurCible	Dosage kg/ha	DAR (jours)
Aubergine	Araignée rouge <i>Tetranychus urticae</i>	50 ml/hl	3
Vigne	Araignée rouge	40 ml/hl	3
Agrume	<i>Tetranychus urticae</i>		
Tomate	Araignée rouge <i>Tetranychus urticae</i>	50 ml/hl	3
	Aleurode des serres <i>Bremesiatabaci</i>	60 ml/hl	3

La dose recommandée d'un produit a été étudiée pour limiter les risques pour les utilisateurs et les consommateurs, limiter les dégâts sur l'environnement et pour réduire le coût des traitements (ne pas utiliser plus de produits que nécessaire).

Mode d'action :

ASTERIX 24%SC : Non systémique. Affecte le développement et la fécondité des mouches blanches et des acariens; il est également ovicide ASTERIX 24%SC: est utilisé contre les ravageurs de l'Aubergine et la Fraise

Les recommandations d'utilisation

Préparation de la bulles:

- Tout d'abord, le pesticide requis est mélangé avec de l'eau dans un récipient. Le mélange préparé est ajouté au réservoir du dispositif de pulvérisateur qui est plein à moitié niveau avec de l'eau. Le réservoir est rempli d'eau à nouveau et mélangé. Il est prêt à effectuer le traitement.
- Ce mélange est pulvérisé toutes les parties de la plante quand le temps est calme et frais.
- Fraise: La désinfection est effectuée lorsque 15 insectes mobiles par feuille sont visibles à partir de 50 feuilles représentant le champ. S'il ya des fruits mûrs.
- La mouche blanche: le traitement est effectué lorsque vous voyez 0,5-2 larves en période mai-juin; 2-3 larves en juillet-août et 3 larves en septembre par feuille, compte tenu de 50 feuilles.

- Porter des gants de protection/des vêtements de protection
- Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter le rejet dans l'environnement et Recueillir le produit répandu.



AGROMOSTA
Le Choix de Cultiver

+213 45 48 29 40

Cité si Khaled Mesra 27255
Mostaganem, Algérie

contact@agromosta.com



Producteur: ANGLO GULF FZCO,
P.O.Box 16887, Jebel Ali Free Zone, Plot No : WWA-129, Nr.10th round About, Dubai, United Arab Emirates .



أستيريكس 240 مركز مستحلب مبيد للفرداد ومضاد للمتشابهات الاجنحة

الخصائص :

أستيريكس 240: نشط عن طريق التلامس في جميع مراحل تطور عث، وهو مبيد للفرداد يعتمد على سببرومييسيفين الذي ينتمي إلى عائلة كيميائية جديدة من الأحماض التيترونك، وهو يعمل على العث في مراحل مختلفة من تطور البيض واليرقات والحوريات والإناث البالغة، الأعراض التي تظهر على العث هي: الجفاف، وتشبب الريش، وتراكم البويضات عند الإناث. عملها تقدمي ومثابرة عملها في المتوسط 7 أسابيع.

التعبئة 1.02 ل

التركيبية :

أستيريكس 240 : يتكون من 240 جم / لتر من سببرومييسيفين

نصائح الاستعمال :

المحصول المستهدف	الآفة	جرعة المستهدفة	مدة قبل الجني
الباذنجان	العنكبوت الأحمر	50 مل / هل	3
الحمضيات والكروم	العنكبوت الأحمر	40 مل / هل	3
طماطم	العنكبوت الأحمر	50 مل / هل	3
	الذبابة البيضاء	60 مل / هل	3

تمت دراسة الجرعة الموصى بها من المنتج للحد من المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون والمستهلكون، والحد من الأضرار التي تلحق بالبيئة وتقليل تكلفة العلاجات لا تستخدم منتجات أكثر من اللازم

طريقة العمل :

أستيريكس : غير جهازي. يؤثر على نمو وخصوبة الذباب الأبيض والعث؛ كما أنه مبيد للبيض ، يستخدم ضد آفات الباذنجان والفراولة

توصيات للاستخدام :

أثناء التخزين : قم بتخزين المنتج في عبوته الأصلية ، في غرف مغلقة ، بعيداً عن جميع الأطعمة والمشروبات ، بما في ذلك تلك المخصصة للحيوانات ، وبعيداً عن متناول الأطفال. يجب أن يكون المبنى بارداً وجيد التهوية

أثناء العمل : أولاً، يتم خلط المبيد المطلوب بالماء في وعاء. يضاف الخليط المحضر إلى خزان جهاز الرش الذي يمتلئ بنصفه بالماء. يملأ الخزان بالماء مرة أخرى ويخلط. إنه مستعد لإجراء العلاج، يرش هذا الخليط على جميع أجزاء النبات عندما يكون الجو هادئاً وبارداً

الفراولة: يتم الرش عند ظهور 15 حشرة متحركة لكل ورقة من 50 ورقة تمثل الحقل. إذا كان هناك ثمار ناضجة

الذبابة البيضاء: تتم المعالجة عندما ترى 2-0.5 يرقة في الفترة من مايو إلى يونيو. 2-3 يرقات في يوليو- أغسطس و 3 يرقات في سبتمبر لكل ورقة، بالنظر إلى 50 ورقة يستخدم ضد آفات الباذنجان والفراولة: تحضير الخليط

- ارتداء القفازات الواقية / الملابس الواقية

- لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند التعامل مع هذا المنتج.

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

- عدم رمي المحلول المتبقي في الطبيعة مع غسل المرش بعد كل إستعمال



AGROMOSTA
Le Choix de Cultiver

+213 45 48 29 40 ☎

حي سي خالد ماسرة 27255
مستغانم ، الجزائر 📍

contact@agromosta.com ✉

