

# ZELTIMEC 1.8 EC

INSECTICIDE / ACARICIDE

## Propriétés

ZELTIMEC 1.8 EC est un insecticide acaricide contenant 18g/l d'Abamectine sous forme de Concentré émulsionnable (EC), il agit par contact et par ingestion sur les acariens et les mineuses des Cultures maraîchères, Agrumes et Palmier dattier.

## Conditionnement

1.05 L

### Composition :

contient 18 gr d'Abamectine

### Compatibilité :

incompatible avec la plupart des pesticides

### Mode d'utilisation :

CATEGORIE D'UTILISATION	DOSE	D.A.R
Acariens - Des cultures maraîchères - Des agrumes - Du palmier dattier	75ml/hl 50ml/hl 50ml/hl	14 jours
Mineuse - Des cultures maraîchères - Des agrumes	75ml/hl 50ml/hl	7 jours 14 jours

### Précautions D'emploi :

- Suivre les recommandations portées sur l'étiquette ;
- Ne pas fumer et boire pendant son application ;
- Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements ;
- Porter les gants, masque, lunettes en traitant ;
- Se laver les mains après chaque traitement ;
- Conserver à l'écart de toute flamme ou étincelles ;
- Ne pas utiliser les emballages vides, les détruire par incinération et les enfouir très profondément loin des localités d'habitation
- Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas des problèmes induits par une mauvaise utilisation ou conservation de ce produit".
- Produit toxique pour les organismes aquatiques, les abeilles et les insectes pollinisateurs.
- Eviter le traitements près des plans d'eau et période de



**AGROMOSTA**  
*Le Choix de Cultiver*

+213 45 48 29 40

Cité si Khaled Mesra 27255  
Mostaganem, Algérie

contact@agromosta.com



Fournisseur : ZELLAG AG  
Im Singeisenhof 9, 4125 Riehen (Suisse)

**ZELLAG**

# زالتيماك 1.8 مركز مستحلب

مبيد حشري/ عناكبي يعمل باللامسة وعن طريق البلع

الخصائص :

زالتيماك EC 1.8 مبيد حشري عناكبي يحتوي على 18 غ/ل من الأباكتين على هيئة سائل مركز قابل للإستحلاب، يعمل باللامسة وعن طريق البلع، متميز بتأثيره القوي على الجهاز العصبي للعناكب وصناعات الأنفاق على الخضروات والحمضيات والنخيل.

التعبئة

1.05 ل

التركيبية :

يحتوي على 18 غ من أباكتين

قابلية الخلط :

غير قابل للخلط مع معظم المبيدات

نصائح الاستعمال :

مدة قبل الجني	الجرعة	فئة الإستعمال
14 يوم	75 مل/هل 50 مل/هل 50 مل/هل	العث - الخضروات - الحمضيات - النخيل
7 أيام 14 يوم	75 مل/هل 50 مل/هل	صناعات الأنفاق - الخضروات - الحمضيات

توصيات للاستخدام:

- يجب اتباع التعليمات المدونة في الملصق
- عدم تناول الطعام والشراب أو التدخين أثناء الرش
- ارتداء الملابس الواقية أثناء التعامل بالمبيد،
- عدم استعمال العبوات الفارغة.
- منتج سام للكائنات المائية والنحل والحشرات الملقحة
- تجنب العلاج بالقرب من المسطحات المائية وخلال فترة التزهير
- الاسعافات الأولية:

عند البلع: عدم ارغام المريض على التقيؤ، نقل المصاب إلى المستشفى لغسل المعدة عند الاستنشاق: نقل المريض الى منطقة جيدة التهوية و مراقبته. في حال وجود صعوبة في التنفس، استعمال التنفس الاصطناعي.

عند ملامسة الجلد: نزع الملابس الملوثة، غسل الجسم بالماء الوفير و الصابون. عند ملامسة العينين: غسل العين بالماء الوفير لمدة 15 إلى 20 دقيقة. استدعاء الطبيب في حال استمرار تهيج العين.

الترياق: لا يوجد ترياق محدد، يتم العلاج حسب الأعراض.



**AGROMOSTA**  
Le Choix de Cultiver

+213 45 48 29 40

حي سي خالد ماسرة 27255  
مستغانم، الجزائر

contact@agromosta.com

ZELLAG

المصدر: زيلاق أ.ج

إم سينقيسانهوف 9، 4125 رياهان - سويسرا